

# 「ばら」、農薬散布スケジュール例

平成31年3月改定

回数	散布日	活性剤、液剤	展着剤	殺菌予防剤		殺菌予防・治療剤		殺菌治療剤		殺虫剤			殺ダニ剤
				黒星病・うどん粉病	うどん粉病	黒星病・うどん粉病・灰色カビ病・べと病	黒星病	うどん粉病	アブラムシ	スリップス(アザミウマ)	オオタバコガ、ヨトウムシ、コナガ	ハダニ、カンザワハダニ	
		ばら活性剤、パワーアップ、トップレッシング、ピカコーetc	アブローチBI	ポリキャブタン水和剤、フルビカFL、ダコニール1000FL、トップジンM	サンヨール乳剤(殺虫殺菌剤)、ルビゲン水和剤、ポリオキシソル水溶剤	ベンレート水和剤、ジマンダイセン水和剤、サルバトールME液剤、サブロール乳剤	ラリー乳剤、フルビカFL、サブロール乳剤	カリグリーン水溶剤、トリフミン水和剤・乳剤、ルビゲン水和剤、パンチョ顆粒水溶剤、ガッテン乳剤、アミスター20(ばら適用外)	オルトラン水和剤、アドマイヤー顆粒水和剤、スミチオン乳剤、アデイオン乳剤、アクトリック乳剤	スピノース顆粒、ベストカード水溶剤、ダントツ水溶剤、カスケード乳剤水溶剤	アファーム乳剤、マッチ乳剤等	コロマイト、ニッソラン、カネマイト、ダニ太郎(マイトコーネ)FL、ダニサラバFL	
1	4月中旬	活性剤、PU1500倍	1500倍	ダコニール1500倍					オルトラン1500倍				
2	4月下旬	活性剤、PU1500倍	1500倍	ダコニール1500倍					スミチオン1500倍	スピノース5000倍又はベストカード1000倍			
3	5月初旬	活性剤、PU1000倍	1000倍	ポリキャブタン500倍	サンヨール500倍			うどん粉治療トリフミン3000倍	スミチオン1000倍	ダントツ4000倍			
4	5月連休明け	活性剤、PU1000倍	1000倍	ポリキャブタン500倍	サンヨール500倍			うどん粉治療アミスター202000倍		ダントツ3000倍			
5	5月中旬	活性剤、PU1000倍	1000倍	ポリキャブタン500倍		ベンレート3000倍		うどん粉治療ガッテン5000倍	スミチオン1000倍			コロマイト2000倍又はニッソラン3000倍	
6	5月下旬	活性剤、PU1000倍	1000倍	オーソサイト800倍		ベンレート3000倍							
7	6月上旬以降の雨上がり	活性剤、PU1000倍	1000倍	オーソサイト800倍		ジマンダイセン500倍(べと病)	ラリー3000倍						
8	6月末頃	活性剤、PU1000倍	1000倍				黒星病治療サブローズ1000倍2日おきに3回単連用					ハダニ治療ダニ太郎(マイトコーネ)1000倍	
9	7月上旬	活性剤、PU1000倍	1000倍	フルビカFL2000倍		サルバトール3000倍					マッチ2000倍	ハダニ治療ダニサラバ1000倍	
10	7月中旬	活性剤、PU1000倍	1000倍	フルビカFL2000倍		サルバトール3000倍					マッチ2000倍		
11	7月下旬	活性剤、PU1000倍	1000倍	フルビカFL2000倍		サルバトール3000倍			コガネムシ、チュウレンバチなど家庭用殺虫ジェットスプレー		マッチ2000倍		
12	8月上旬	活性剤、PU1000倍	1000倍	フルビカFL2000倍		サルバトール3000倍							
13	旧盆前後	活性剤、PU1000倍	1000倍	ポリキャブタン500倍			ラリー3000倍				マッチ2000倍		
14	8月末剪定前	活性剤、PU1000倍	1000倍	ポリキャブタン500倍			ラリー3000倍				マッチ2000倍		
15	9月初旬剪定直後	活性剤、PU1000倍	1000倍	ポリキャブタン500倍			ラリー3000倍			アデイオン1000倍			
16	9月中旬	活性剤、PU1000倍	1000倍	オーソサイト800倍	ルビゲン3000倍				アデイオン1000倍		アファーム2000倍		
17	9月下旬	活性剤、PU1000倍	1000倍	オーソサイト800倍	ルビゲン3000倍				アクトリック1000倍	ダントツ3000倍	アファーム2000倍		
18	10/10頃	活性剤、PU1000倍	1000倍	ダコニール1000倍	ルビゲン3000倍		黒星病が発生した場合は春のサブロール連用を行う	うどん粉病が発生した場合は春の特効薬を用いる	アクトリック500倍	ダントツ3000倍	アファーム2000倍		
19	10/20頃	活性剤、PU1000倍	1000倍	ダコニール1000倍	ルビゲン3000倍				アクトリック500倍	ダントツ3000倍			
20	11月初旬	活性剤、PU1000倍	1000倍	ダコニール1000倍	サンヨール500倍				アクトリック500倍				

注:うどん粉病予防薬に効果大のストロベ-はばらには登録がないので注意。木、竹酢液とダコニール(TPN剤)との混用は相性が悪いので避ける。

注:盛夏はダコニールは避ける。雨前のダコニールとコーティング系展着剤アピオンEとの組合せは効果大

注:黒星病が出なければサブロール(EBI剤)の多用は避ける。ウドンコ病発生ならカリグリーン・トリフミン・サルバトール・パンチョなど

注:9月中旬以降「夜盗虫」「オオタバコガ」発生すれば、アファーム・カスケード・マッチ等を使用。

注:8月・9月コガネムシ多発時にはスミチオン・レホン・アデオン等

注:トップレッシング等、有機液体肥料はコンテスト前適宜使用するが、基本的にはあまり使用しない。液肥は自己責任で

注:小規模なら市販のベニカXスプレータイプでも良い。非農薬系の粘着くん・アーリーセーフなど天然系も人気