３歳までに受ける予防接種（令和６年４月以降改訂版）　　いとうわんぱくクリニック

⑴ 濃い影は接種推奨年齢，薄い影は接種できる年齢です。
⑵ 接種できる年齢でも，問診票に書かれた年齢以外では，接種料金が有料になります
⑶ Hib ワクチン，肺炎球菌ワクチンは接種を開始する年齢により，接種回数が変わります。
⑷ ５種混合ワクチンは２種類のワクチンがあります。初回接種ワクチンと同一の製剤で計４回接種します。
⑸ B 型肝炎の公費接種は１歳未満の場合に限ります。それ以外の方は有料です。
⑹ ロタウイルスワクチンは２回接種と３回接種のものがあります。どちらも１回目の接種は生後 15 週に入るまでに始めましょう。
　ワクチンの種類を途中で変更することはできません。

ワクチン名	種類	年齢	接種回数・間隔	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	1歳	2歳
5種混合（4種＋Hib）	不活化	2ヶ月～7歳半	4回（3週以上開けて3回、半年後4回）												
インフルエンザb(Hib)	不活化	2ヶ月～5歳	1ヶ月毎3回・その後7ヶ月以後4回目												
肺炎球菌（PCV13）	不活化	2ヶ月～5(6)歳	1ヶ月毎3回・1歳以上で4回目												
4種混合ワクチン	不活化	3ヶ月～7歳半	3-8週あけて3回・1年後1回												
ロタウイルス(ﾛﾀﾘｯｸｽ)	生	生後6週～24週	2回（4週間以上あけて）												
ロタウイルス（ﾛﾀﾃｯｸ）	生	生後6週～32週	3回（4週間以上あけて）												
B型肝炎	不活化	2ヶ月以降	4週以上あけて2回・初回から20週以後3回目												
BCG	生	2ヶ月～1歳未満	1回												
はしか・風疹（MR）	生	1-2歳・5-6歳	2回（1歳台・入学前1年）												
水痘（みずぼうそう）	生	1歳以上3歳未満	2回（3-6ヶ月以上あけて）												
おたふくかぜ（ムンプス）	生	1歳以上	1回（小学校入学前に2回目推奨）												